

Prelievo del 16 settembre 2019

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Varietà Merlot								
Bellinzona	Bellinzona-Bellinzona	Galbisio	246	91.9	22.0	6.4	3.41	1.54
	Bellinzona-Cadenazzo	al Grotto	264			np		
	Bellinzona-Camorino	Montagna	330	89.2	21.4	7.2	3.26	1.58
	Bellinzona-Giubiasco	Ferradina	239	83.9	20.2	6.7	3.37	1.69
	Bellinzona-Gudo	Caneggio	281	89.2	21.4	6.8	3.37	1.50
	Lumino	Ronco	299	83.9	20.2	6.9	3.28	1.68
	Bellinzona-Monte Carasso	Pedemonte	275	92.8	22.2	6.3	3.45	1.64
	Bellinzona-Sant'Antonino	Campoglia	263	87.9	21.1	6.3	3.35	1.77
	Bellinzona-Sementina	Mondò	372	90.6	21.7	6.1	3.46	1.75
Blenio	Serravalle-Ludiano	Vigna Smarza	481	75.5	18.3	9.3	3.15	1.88
	Serravalle-Malvaglia	Campagna	378	80.8	19.5	9.3	3.21	1.99
Leventina	Giornico	Lorett	404	79.4	19.2	8.8	3.22	1.69
Locarno	Cugnasco e Gerra-Cugnasco	Bosciorodo	212	84.3	20.3	7.5	3.31	1.75
	Cugnasco e Gerra-Gerra	Ca' di sopra	248	90.6	21.7	5.5	3.47	1.67
	Gambarogno-Contone	Sparavera	254	87.4	21.0	7.4	3.32	1.74
	Gordola	Sant'Antonio	271	94.7	22.6	5.8	3.47	1.67
	Lavertezzo	Montedato	310	92.4	22.1	6.1	3.49	1.60
	Minusio	Noledo	368	94.7	22.6	7.0	3.28	1.68
	Tenero-Contra	Moresio	329	92.8	22.2	7.2	3.28	1.78
	Terre di Pedemonte-Cavigliano	Pezze delle Gerre	249	90.1	21.6	7.0	3.39	1.35
	Terre di Pedemonte-Verscio	Salino	244	92.4	22.1	6.3	3.43	1.57

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Lugano	Arogno	Devoggio	510	88.8	21.3	9.4	3.17	1.76
	Bioggio-Bioggio	Zotta	404	87.0	20.9	7.8	3.28	1.56
	Croglio	Valleggiolo	444	84.8	20.4	8.7	3.19	1.60
	Lamone	Carnago	364	87.0	20.9	6.5	3.42	1.63
	Monteceneri-Bironico	Ul Capon	529	85.2	20.5	8.4	3.25	1.54
	Porza	San Rocco	531	88.8	21.3	8.3	3.14	1.55
	Sessa	Lanera	411	81.2	19.6	8.3	3.21	1.80
	Vezia	Ronco	336	83.4	20.1	7.1	3.33	1.59
Mendrisio	Balerna	Mezzana	306			vendemmiato		
	Breggia-Morbio Superiore	Ronchi	418	98.3	23.4	6.9	3.30	1.50
	Castel San Pietro-Castel San Pietro	Vigino	403	90.6	21.7	7.1	3.25	1.53
	Chiasso-Pedrinata	Roncaccio	427	93.3	22.3	6.8	3.38	1.52
	Coldrerio	Campagnola	341	89.7	21.5	7.3	3.35	1.88
	Mendrisio-Arzo	Minas	506	89.2	21.4	6.9	3.27	1.24
	Mendrisio-Besazio	Civasca	456	91.9	22.0	6.9	3.16	1.44
	Mendrisio-Generstrerio	Prella	380	87.9	21.1	7.9	3.27	1.76
	Mendrisio-Ligornetto	Museo	374	90.1	21.6	6.5	3.41	1.67
	Mendrisio-Mendrisio	Torre	391	95.1	22.7	6.8	3.31	1.73
	Mendrisio-Meride	Griago	563	91.5	21.9	6.7	3.37	1.26
	Mendrisio-Rancate	Segorida	360	88.3	21.2	7.7	3.30	1.71
	Mendrisio-Salorino	Campagna	462	87.9	21.1	7.5	3.36	1.68
	Morbio Inferiore	Paese	355	96.0	22.9	6.8	3.39	2.02
	Novazzano	Brusata	396	91.0	21.8	7.7	3.36	1.84
	Riva San Vitale	Pasquadigh	298	94.7	22.6	5.4	3.45	1.58
	Stabio	Monticello	427	87.0	20.9	8.0	3.34	1.73
	Vacallo	Ronco	393			np		

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	80.8	19.5	8.5	3.23	1.55
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329			vendemmiato		
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411			np		

Legenda

na: non analizzato
 np: non pervenuto
 gr: forti danni da grandine
 per: forti danni da peronospora
 oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: varietà Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 8/9	88.7	6.6
Blenio	n= 2/2	78.2	9.3
Leventina	n= 1/1	79.4	8.8
Locarno	n= 9/9	91.0	6.6
Lugano	n= 8/8	85.8	8.1
Mendrisio	n= 16/18	91.4	7.1
Riviera	n= 1/1	80.8	8.5

Figura 1: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale (°Oe): varietà Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale (g/L): varietà Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino (g): varietà Merlot

