

Ufficio della consulenza agricola, 6501 Bellinzona

Distretto	Comune	Denominazione locale	Altitudine (m)	Tenore in zucchero naturale		Acidità totale (g/L)	pH	Peso medio dell'acino (g)
				°Oechsle	% Brix			
Riviera	Biasca	Visnone	292	75.9	18.4	8.5	3.17	1.73
Varietà Chardonnay								
Lugano	Vezia	Piana	329	77.2	18.7	8.4	3.23	1.51
Mendrisio	Mendrisio-Besazio	Cesmo	411	85.2	20.5	8.2	3.14	1.34

Legenda

na: non analizzato
np: non pervenuto
gr: forti danni da grandine
per: forti danni da peronospora
oid: forti danni da oidio

Risultati medi per distretto: Merlot

		Zucchero °Oe	Acidità totale g/L
Bellinzona	n= 6/8	83.0	7.9
Blenio	n= 1/2	64.6	11.9
Leventina	n= 1/1	72.4	9.9
Locarno	n= 4/9	82.2	7.9
Lugano	n= 6/8	73.1	9.2
Mendrisio	n= 17/18	79.3	8.2
Riviera	n= 1/1	75.9	8.5

Figura I: Confronto grafico del tenore in zucchero naturale: Merlot




Figura 2: Confronto grafico dell'acidità totale: Merlot




Figura 3: Confronto grafico del peso medio dell'acino: Merlot

